

Reflexo Vermelho

Trata-se de exame ocular realizado em recém-nascido com oftalmoscópio direto.

Quando realizar? Antes da alta hospitalar.

Por quê? Para diagnosticar precocemente situações que levam à ausência do reflexo vermelho - como a leucocoria (pupila branca) - causada pela presença de catarata congênita, opacidade congênita de córnea, glaucoma congênito entre outras.

Quem realiza? O neonatologista.

Como realizar? Sala escurecida (facilita sua observação), com oftalmoscópio direto a uma distância de 50 cm. Iluminar os olhos da criança com a luz do oftalmoscópio em direção à pupila. Olhar pelo orifício existente na cabeça do oftalmoscópio; observar um brilho através da pupila, que normalmente é laranja avermelhado. O oftalmoscópio pode ser utilizado com a lente em +4,00 ou ser ajustado a uma graduação que facilite a observação do reflexo vermelho




o teste

O que fazer? Anotar na caderneta de saúde da criança (na pagina 7) ou no cartão de alta do RN, e encaminhar a um oftalmologista, o mais breve possível, , os casos de reflexo vermelho DUVIDOSOS ou AUSENTES.


OLHO NORMAL

reflexo vermelho **presente bilateral**



OLHO ANORMAL

reflexo vermelho **duvidoso no olho direito**



OLHO ANORMAL

reflexo vermelho **ausente no olho direito**

